LEGAMBIENTE
LAZIO

ALLARME SMOG A ROMA - Le tabelle

Nella Tabella 1 è indicato il valore per le polveri sottili PM10 nelle centraline a ROMA, dal 16 al 26 Novembre 2009 (in microgrammi per metro cubo)

	002 Preneste	003 Francia	005 Magna Grecia	008 Cinecittà	039 Villa Ada	047 Fermi	048 Bufalotta	049 Cipro	055 Tiburtina	056 Arenula
16 nov 2009	52,0	50,0	49,0	66,0	40,0	53,0	39,0	46,0	62,0	46,0
17 nov 2009	63,0	77,0	64,0	77,0	51,0	62,0	60,0	65,0	78,0	61,0
18 nov 2009	80,0	74,0	72,0	92,0	59,0	70,0	64,0	74,0	93,0	68,0
19 nov 2009	93,0	75,0	92,0	98,0	59,0	76,0	63,0	69,0	90,0	74,0
20 nov 2009	100,0	81,0	91,0	109,0	64,0	79,0	69,0	73,0	94,0	83,0
21 nov 2009	92,0	73,0	76,0	91,0	55,0	71,0	60,0	67,0	85,0	66,0
22 nov 2009	79,0	67,0	70,0	85,0	49,0	70,0	52,0	65,0	76,0	63,0
23 nov 2009	80,0	73,0	74,0	76,0	49,0	73,0	54,0	70,0	78,0	67,0
24 nov 2009	57,0	61,0	55,0	64,0	42,0	57,0	44,0	56,0	60,0	51,0
25 nov 2009	68,0	72,0	65,0	69,0	45	63,0	52,0	58,0	70,0	55,0
26 nov 2009	61,0	63,0	57,0	60,0	45,0	58,0	46,0	49,0	58,0	51,0

Elaborazione Legambiente Lazio su dati ARPA Lazio

Dati aggiornati al 26 Novembre 2009
Tabella 2

Centralina	PM 10 nel 2009 numero giorni superamento/anno al 26/11/2009
Francia	59
Fermi	56
Tiburtina	54
Cinecittà	40
Preneste	40
Magna Grecia	37
Arenula	31
Cipro	24
Bufalotta	17
Villa Ada	11
Totale	**369**

Elaborazione Legambiente Lazio su dati ARPA Lazio

LEGAMBIENTE
LAZIO

Tab. 3. Consistenza parco veicolare autovetture nel Comune di Roma, per classe di inquinamento (base dati anno 2007).

ALIMENTAZIONE	EURO 0	EURO 1	EURO 2	EURO 3	EURO 4	ALTRO (NC/NI)	TOTALE COMPLESSIVO
BENZINA	201.422	170.966	324.823	209.167	277.148	1.038	1.184.564
GASOLIO	28.635	15.898	64.033	226.078	332.030	28	666.702
BENZINA O GAS LIQUIDO	18.411	7.237	9.304	2.805	4.448	3	42.208
BENZINA O METANO	380	216	472	334	1.848	2	3.252
DATO NON IDENTIFICATO	344	18	27	19	440	41	889
ALTRE	46	1		2	2	6	57
TOTALE	**249.238**	**194.336**	**398.659**	**438.405**	**615.916**	**1.118**	**1.897.672**

Elaborazione Legambiente Lazio su dati Ufficio Studi ACI.

Tab. 4. Consistenza parco veicolare autocarri merci nel Comune di Roma, per classe di inquinamento (base dati anno 2007).

ALIMENTAZIONE	EURO 0	EURO 1	EURO 2	EURO 3	EURO 4	EURO 5	ALTRO (NC/NI)	TOTALE COMPLESSIVO
BENZINA	4.096	3.357	5.389	9.893	1.456		15	24.284
GASOLIO	35.530	16.237	30.440	48.601	28.012	331	93	159.290
BENZINA O GAS LIQUIDO	416	212	115	74	25		52	894
BENZINA O METANO	21	16	121	163	218	22	6	567
DATO NON IDENTIFICATO	25	1	3	9	2		4	44
ALTRE	120	3					139	138
TOTALE	**40.208**	**19.826**	**36.068**	**58.740**	**29.713**	**353**	**309**	**185.217**

Elaborazione Legambiente Lazio su dati Ufficio Studi ACI.

Tab. 5. Consistenza parco motocicli nel Comune di Roma, per classe di inquinamento (base dati anno 2007).

FASCIA CILINDRATA MOTO	EURO 0	EURO 1	EURO 2	EURO 3	EURO 4	ALTRO (NI)	TOTALE COMPLESSIVO
Fino a 125	32.147	14.531	39.129	10.316	596	108	96.827
126 - 250	40.467	36.734	53.144	30.710		55	161.110
251 - 750	30.317	18.748	30.783	15.686		56	95.590
Oltre 750	9.213	6.886	6.292	3.938		5	26.334
Non identificato	20	1		101		14	136
TOTALE	**112.164**	**76.900**	**129.348**	**60.751**	**596**	**238**	**379.997**

Elaborazione Legambiente Lazio su dati Ufficio Studi ACI.

LEGAMBIENTE
LAZIO

Come difendersi dall`inquinamento atmosferico
Da http://www.lamiaaria.it/previsioni/comune.aspx?id=Roma

• **Oggi** 27 novembre Effetti sulla salute	dalle 6:00 alle 12:00	dalle 12:00 alle 18:00	dalle 18:00 alle 24:00
	Mediocre	**Mediocre**	**Mediocre**
Bambini	I bambini asmatici dovrebbero limitare l`attività fisica prolungata o intensa all`aperto e tenere con sé l`inalatore	I bambini asmatici dovrebbero limitare l`attività fisica prolungata o intensa all`aperto e tenere con sé l`inalatore	I bambini asmatici dovrebbero limitare l`attività fisica prolungata o intensa all`aperto e tenere con sé l`inalatore
Sportivi	L`attività sportiva prolungata o intensa all`aperto dovrebbe essere ridotta nel caso compaia affaticamento precoce	L`attività sportiva prolungata o intensa all`aperto dovrebbe essere ridotta nel caso compaia affaticamento precoce	L`attività sportiva prolungata o intensa all`aperto dovrebbe essere ridotta nel caso compaia affaticamento precoce
Persone anziane	Limitare l`esposizione prolungata e l`affaticamento all`aperto se compaiono sintomi quali tosse o affanno	Limitare l`esposizione prolungata e l`affaticamento all`aperto se compaiono sintomi quali tosse o affanno	Limitare l`esposizione prolungata e l`affaticamento all`aperto se compaiono sintomi quali tosse o affanno
Persone con problemi polmonari (asma, enfisema o bronchite cronica)	Ridurre l`attività fisica prolungata o intensa all`aperto ai primi accenni di difficoltà respiratoria	Ridurre l`attività fisica prolungata o intensa all`aperto ai primi accenni di difficoltà respiratoria	Ridurre l`attività fisica prolungata o intensa all`aperto ai primi accenni di difficoltà respiratoria
Persone affette da disturbi cardiaci o angina	Gli sforzi all`aria aperta dovrebbero essere limitati alla comparsa di senso di affaticamento	Gli sforzi all`aria aperta dovrebbero essere limitati alla comparsa di senso di affaticamento	Gli sforzi all`aria aperta dovrebbero essere limitati alla comparsa di senso di affaticamento
Tutti gli altri	Nessun accorgimento particolare per gli adulti in buona forma fisica che non svolgono attività intensa o prolungata all`aperto	Nessun accorgimento particolare per gli adulti in buona forma fisica che non svolgono attività intensa o prolungata all`aperto	Nessun accorgimento particolare per gli adulti in buona forma fisica che non svolgono attività intensa o prolungata all`aperto